



Soluté buvable 25 ml

Avec compte gouttes

DIN HM 80021002

## CONSTIPATION

TOUBLES LIÉS À LA CONSTIPATION

### COMPOSITION :

Ingrédients médicinaux	Propriétés de chacun des ingrédients
Alumina 6CH	Constipation atonique, ralentissement du transit digestif.
Causticum 6CH	Paralysie du transit digestif avec constipation, difficultés de défécation, perte de la sensibilité rectale.
Lycopodium 6CH	Difficultés digestives du nourrisson, émission de gaz, météorisme sous ombilical, selles minces, allongées.
Magnesia muriatica 6CH	Syndrome hépatique et digestif avec constipation de selles déshydratées. Intolérance lactée.
Nux vomica 6CH	Constipation avec faux besoins inefficaces et ténésme. Les selles sont difficilement et incomplètement évacuées. Sensibilité de l'abdomen aux secousses de la marche. Digestion difficile et douloureuse.
Sepia officinalis 6CH	Sensation de vide épigastrique ou abdominal. Constipation atonique. Sensation de vide ou de poids abdominal.
Bryonia alba 6CH	Paroi abdominale tendue, sensible à l'effleurement et calmée par la pression forte. Météorisme douloureux, constipation de grosses selles dures, sèches.

### Ingrédients non médicinaux :

Eau purifiée, sorbitol, glycérine, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acide citrique.

### Indications :

Le soluté buvable LES ZAMIS CONSTIPATION est recommandé pour traiter les troubles liés à la constipation : constipation de selles déshydratées, petites et insuffisantes, avec expulsion douloureuse et prolongée.

Abdomen sensible et douloureux.

### Posologie : Voie orale.

*Nourrissons 0 – 11 mois* : 1 à 5 gouttes, 1 à 3 fois par jour. A prendre aux 30 minutes au début du traitement jusqu'à 10 fois par jour, puis revenir à la posologie générale.

*Enfants 1 – 5 ans* : 5 à 10 gouttes, 1 à 3 fois par jour. A prendre aux 30 minutes au début du traitement jusqu'à 10 fois par jour, puis revenir à la posologie générale.

*Enfants 6 – 11 ans* : 5 à 15 gouttes, 1 à 3 fois par jour. A prendre aux 30 minutes au début du traitement jusqu'à 10 fois par jour, puis revenir à la posologie générale.

À prendre directement sous la langue à l'aide du compte gouttes ou à diluer dans un peu d'eau avant de le prendre.

### Mises en garde :

Si les symptômes persistent au delà de 4 jours ou sont accompagnés de fièvre, consulter un praticien de la santé qualifié. Garder hors de la portée des enfants.

### Interactions médicamenteuses :

Aucune interaction médicamenteuse connue.



Taille : H 10.5 cm x L 5 cm x P 5 cm

Poids 56 g

UPC 6 65808 11007 0